

# Lijst met generieke afwijkingen voor het jaar 2020 inclusief de randvoorwaarden op vlak van het te gebruiken product en de omstandigheden van het gebruik

<b>Afwijkingsnummer GL2021-01</b>	<b>Bestrijding van de bruine rat - <i>Rattus norvegicus</i></b>
<p><u>Product</u></p> <p>Rodenticides met als werkzame stof bromadiolone of difenacoum in 0,005%, die volgens de toelatingsakte geschikt zijn voor het bestrijden van de bruine rat buiten, in open terrein.</p> <p>Deze rodenticides zijn alleen te kopen en te gebruiken door geregistreerde professionele gebruikers.</p> <p><u>Omstandigheden</u></p> <p>Afgeschermd uitgelegd in bakken of buizen. Alleen voor curatief gebruik na het vaststellen van ratten, in de omgeving van bewoning, kunstwerken of andere infrastructuur.</p> <p><u>Alternatieve methoden</u></p> <p>Preventief kunnen voedselvoorraden (compost, voederbakken,...) en de toegang tot gebouwen, leidingen en infrastructuur beter worden afgeschermd.</p> <p>Vallen en klemmen bestaan in vele soorten.</p> <p>Draag handschoenen bij het plaatsen van de klem om er geen geur op achter te laten.</p> <p><u>Verantwoording</u></p> <p>Het uitroeien van de rat in Vlaanderen is onmogelijk. Het effect van een bestrijding van bruine ratten is altijd tijdelijk en lokaal. Het bestrijden van de bruine rat op plaatsen waar geen schade kan optreden of geen hinder te verwachten is door het voorkomen van bruine ratten is niet efficiënt en niet zinvol. Het gebruik van rattenvergift zorgt ook voor vergiftiging van niet doelwitorganismen (bv. muizen) en er treedt secundaire intoxicatie op van predatoren die vergiftigde ratten opeten.</p> <p>Omdat de bruine rat drager is van pathogenen (zoals Leptospirose, <i>Salmonella</i> spp., <i>Toxoplasma gondii</i> en allerlei bacteriën, parasieten en virussen) is het chemisch bestrijden nog toegelaten in de omgeving van bewoning en infrastructuur. Bij het optreden van schade kan ook chemisch bestreden worden.</p> <p>De bruine rat moet niet meer bestreden worden maar je mag de soort nog bestrijden wanneer je er overlast van ondervindt.</p> <p>De niet-chemische bestrijdingsmethoden zijn niet altijd afdoende om een rattenplaag te bestrijden of te verhinderen maar in veel gevallen kunnen ze wel de inzet van chemische middelen beperken en zijn ze de eerste optie die ingezet moet worden.</p>	

Product

Biocide met een toelating voor het bestrijden van wespen buiten gebouwen. Gebruik geen producten in het vrije veld.

Omstandigheden

Alleen op plaatsen waar er als gevolg van de aanwezigheid van kolonievormende wespen een gevaar is voor mensen zoals op speelterreinen, aan gebouwen, ...

Alternatieve methoden

Hoe vroeger op het seizoen, hoe eenvoudiger het is om de volledige wespenkolonie te vangen. Als de koningin vanaf begin april opgemerkt wordt, vang dan direct de koningin en haar nest.

Op kleine schaal is het mogelijk om wespenvallen te gebruiken. Dit zijn fuiksystemen waar wespen wel in maar niet meer uitgeraken. De lokstof is best zoet en waterig om aantrek en verdrinking van de wespen in de hand te werken. Zoete vloeistoffen met een beperkte hoeveelheid alcohol voldoen hier het best.

Mechanisch kan de wespenkolonie bestreden worden, door de kolonie te vangen in een jutezak en die te verbranden. Laat dit over aan de specialist. Wespen keren terug naar hun nest als het donker is. Het verwijderen van het nest gebeurt dan ook best 's avonds als het donker is.

Niet te verwarren met hommels en bijen, die een beschermde status genieten.

Verantwoording

Bepaalde kolonievormende wespen kunnen agressief zijn. Vooral in de nabijheid van kinderen kan dit een gevaar betekenen.

De alternatieve methoden voor het verwijderen van wespen zijn niet zonder gevaar voor diegene die het wespennest verwijdert.

Product

Alleen injectie is toegestaan met een herbicide dat is toegelaten voor injectie van duizendknopen.

Omstandigheden

Alleen wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- (1) er gebeurt geen bladbehandeling;
- (2) de aanbevolen bestrijdingsperiode loopt van 15 augustus tot en met 15 september;
- (3) het product wordt gebruikt door middel van injectie (indien hiervoor erkend en alleen met gespecialiseerde apparatuur) en volgens de toelatingsvoorwaarden zoals opgenomen in de toelatingsvoorwaarden van het gebruikte product, te vinden op [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be);
- (4) de bestrijding gebeurt met het oog op het lokaal uitroeien van de haard;
- (5) de volledige groeiplaats wordt aangepakt om hergroei of herkolonisatie te vermijden. Voor groeiplaatsen die verspreid zijn over percelen van meerdere terreinbeheerders moet een gezamenlijke aanpak gegarandeerd worden
- (6) er is niet meer dan één behandeling per jaar en er worden maximaal twee bestrijdingen met pesticiden uitgevoerd per locatie;
- (7) na de bestrijding met pesticiden wordt de situatie gedurende een periode van minimaal 5 jaar opgevolgd en waar nodig worden overlevende fragmenten opgegraven en afgevoerd naar een erkende composteerder;
- (8) na het nazorgtraject van 5 jaar kan de behandeling met pesticiden herhaald worden;
- (9) de bestrijding gebeurt niet binnen een zone van 1 meter langs het oppervlaktewater.

Alternatieve methode

Inplanten met wilgen (natte standplaats) of hazelaar (drogere standplaats) kan zorgen voor een onderdrukking van Japanse duizendknoop.

Het uittrekken of uitsteken van volgroeide planten is haalbaar bij lage dichtheden, wanneer de soort nog geen groot areaal heeft ingenomen. De wortelstokken worden best mee uitgegraven.

Frequent maaien is heel intensief maar kan werken op arme grond. Mijd zeker klepelmaaien, die methode zorgt voor verspreiding van Japanse duizendknoop door het wegslingeren van plantenfragmenten zoals wortelstokken die mogelijk opnieuw kunnen wortelen.

Maaiafval – niet met gewoon groenafval – afvoeren naar gespecialiseerd compostingsbedrijf of opslaan in lichtvrije verpakking. Dit om verspreiding van de soort te voorkomen.

Verantwoording

Deze niet-inheemse soorten van de duizendknoop kennen een enorme uitbreiding doorheen Europa. Op plekken waar ze voorkomen wordt de overige vegetatie

weggeconcentreerd. Dit resulteert in een bedreiging voor de biodiversiteit. De  
groeikracht van de plant kan schade veroorzaken aan wegen en kunstwerken. Het  
grootste probleem voor alternatieve bestrijding is het ondergrondse deel van de plant.  
Ondergrondse stengels zijn moeilijk te verwijderen en als ze niet verwijderd worden,  
vormt zich een nieuwe plant.

**Afwijkingsnummer  
GL2021-06**

**Bestrijding van eikenprocessierups - *Thaumetopoea  
processionea***

#### Product

Federaal product toegelaten / erkend voor de bestrijding van de eikenprocessierups met als werkzame stof *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*

#### Voorwaarden

Alleen wanneer aan **alle** onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- (1) er gebeurt geen bestrijding in gebieden van het VEN, natuurreserveaat, bosreserveaat of openbaar bos tenzij daar een ontheffing voor verleend werd door het ANB;
- (2) de bestrijding gebeurt volgens de voorwaarden in de federale erkenning of toelating van het gebruikte product;
- (3) het product wordt alleen toegepast binnen de termijn gecommuniceerd door de provincie;
- (4) het product wordt alleen toegepast langs aangeduide wandelpaden en fietsroutes en in de directe omgeving van publiek belangrijke plaatsen zoals scholen, speeltuinen, recreatiedomeinen, sportterreinen, begraafplaatsen;
- (5) het gebruik van het product maakt deel uit van een gecoördineerde aanpak in combinatie met alternatieve methoden;
- (6) het steunen van verder onderzoek naar de processierups en haar monitoring door onder meer het bijhouden van het voorkomen, de bestrijdingsresultaten en het productgebruik volgens de richtlijnen van de provincies;
- (7) vooraf aanmelden van het gebruik van het product door het invullen van het formulier te vinden op de website van de VMM waarin ook de informatie van (6) bevraagd wordt;
- (8) er gebeurt communicatie naar de bewoners;
- (9) rapportering gebeurt voor 1 april 2021 van:
  - de hoeveelheid gebruikt product via de online inventaris;
  - de effectief behandelde locaties.

#### Alternatieve methoden

Branden en opzuigen zijn efficiënte methoden en kunnen erg specifiek worden toegepast. Bij beperkte haarden vormen zij de voorkeursmethoden.

#### Verantwoording

Eikenprocessierups heeft vanaf het derde rupsenstadium brandharen op het lichaam. Deze brandharen vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid wanneer zij loskomen. De allergische reacties die hierdoor optreden kunnen aanzienlijk zijn.

Hoewel dit middel biologisch is, is het niet-selectief. Dat wil zeggen dat veel vlinderrupsen die in het voorjaar op eikenloof leven, hieraan kunnen sterven met mogelijk ook indirecte gevolgen op het ecosysteem.

Branden en opzuigen zijn kostelijker vanwege langere tijdsduur en daardoor niet steeds haalbaar op locaties met een hoge plaagdruk.

Een geschikte monitoringsmethode is cruciaal om probleemzones van het volgend jaar te identificeren en de bevolking te informeren over de verwachte hinder en het nemen van maatregelen. Op die manier kan sterk bespaard worden op uitgaven voor bestrijding.

Product

Rodenticides die volgens de toelatingsakte geschikt zijn voor het bestrijden van zwarte rat rondom gebouwen.

Omstandigheden

Afgeschermd uitgelegd in beveiligde lokaasdozen in de onmiddellijke omgeving (minder dan 1 meter) van gebouwen.

Alleen voor **curatief** gebruik na het vaststellen van ratten in gebouwen en na het vaststellen van schade.

Alternatieve methoden

Preventief kunnen voedselvoorraden (compost, voederbakken,...) en de toegang tot gebouwen, leidingen en infrastructuur beter worden afgeschermd.

Vallen en klemmen bestaan in vele soorten. Afgeschermd lokaasbakken met klemmen blijken het meest efficiënt.

Draag handschoenen bij het plaatsen van de klem om er geen geur op achter te laten.

Verantwoording

Het uitroeien van de zwarte rat in Vlaanderen is onmogelijk. Het effect van een bestrijding van zwarte ratten is altijd tijdelijk en lokaal.

Zwarte ratten zijn vooral te vinden in gebouwen met veel schuil- en nestplaatsen. Zwarte ratten zijn uitstekende klimmers. In tegenstelling tot de bruine rat is de zwarte rat geen goede zwemmer en treft men haar zelden aan in de nabijheid van water. Net zoals de bruine rat kan de zwarte rat bepaalde ziektes overbrengen.

Het gebruik van rattenvergift zorgt ook voor vergiftiging van niet doelwitorganismen (bv. muizen) en er treedt secundaire intoxicatie op van predatoren die vergiftigde ratten opeten.

De zwarte rat moet niet meer bestreden worden maar je mag de soort nog bestrijden wanneer je er overlast van ondervindt.

De niet-chemische bestrijdingsmethoden zijn niet altijd afdoende om een rattenplaag te bestrijden of te verhinderen maar in veel gevallen kunnen ze wel de inzet van chemische middelen beperken en zijn ze de eerste optie die ingezet moet worden.

**Afwijkingsnummer  
GL2021-08**

**Ontsmetting van materiaal ter preventie van  
Chytridiomycose**

Product

Desinfecteermiddelen die volgens de toelatingsakte geschikt zijn voor het ontsmetten van materialen.

Omstandigheden

Alleen wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- (1) toegepast voor het ontsmetten van materialen zoals fuiken, netten, laarzen, ... die mogelijk in contact kwamen met besmet water;
- (2) niet binnen een zone van 6 meter langs het oppervlaktewater;
- (3) alleen als het gebruikte product de bodem niet kan verontreinigen door bijvoorbeeld het gebruik van een plastic zeil onder het te ontsmetten materiaal of het ontsmetten in plastic containers.

Alternatieve methoden

Volgen van het bioveiligheidsprotocol van het ANB voor chytridiomycose: het beperken van veldwerk in risicogebieden, het wegblijven uit bekende ziektehaarden, de routinematige ontsmetting van vangfuiken, het reinigen van schoeisel, dienstvoertuigen en boten, en het gebruik van een tweede set laarzen of waadpak bij het bezoeken van meerdere gebieden.

Verantwoording

Chytridiomycose veroorzaakt een grote sterfte onder inheemse amfibieënpopulaties. In het kader van monitoring en wetenschappelijk onderzoek blijven vangsten nodig. Om de verspreiding van de schimmel een halt toe te roepen moet het materiaal ontsmet worden. In het veld is dat enkel haalbaar doormiddel van het gebruik van ontsmettingsmiddelen op de gebruikte fuiken, laarzen, netten, ...